Manejar la Hiperglucemia

USO DE LOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1

¿QUE SON LOS ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE GLP-1?

Los antagonistas del receptor de GLP-1 artificiales son una clase de medicamentos que imitan las acciones de GLP-1 que ocurren de forma natural.

Estos medicamentos no solo reemplazan la pérdida de GLP-1, sino que también proporcionan efectos ampliados. Como la insulina, estas medicinas serían destruidas por el ácido estomacal si son tomadas vía oral. Por ello, deben ser inyectados de manera subcutánea para que funcionen.

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE MEDICAMENTO?

Los medicamentos GLP-1 son utilizados además de una alimentación saludable y actividad física para bajar los niveles de glucosa en la sangre en personas con diabetes tipo 2. Existen varios tipos diferentes de medicamentos GLP-1 disponibles. Todos pueden utilizarse solos o junto con otras medicinas. La principal diferencia entre ellos es con qué frecuencia los toma, desde dos veces al día hasta una vez a la semana, y cuántos efectos secundarios podrían ocurrir. En general, la versión de una vez por semana causa menos náuseas y vómitos que aquellos que se toman a diario.

ANTAGONISTAS DE GLP-1 APROBADOS Hasta enero de 2018

Marca genérica Nombre	Nombre de marca	Dosis	Fabricante
Exenatide	Byetta	Dos veces al día	AstraZeneca
Liraglutide	Victoza	Una vez al día	Novo Nordisk
Lixisenatide	Adlyxin	Una vez al día	Sanofi-Aventis
Dulaglutide	Trulicity	Una vez a la semana	Eli-Lilly
Exenatide	Bydureon	Una vez a la semana	AstraZeneca
Semaglutide	Ozempic	Una vez a la semana	Novo Nordisk

 Copyright © 2020 Association of Diabetes Care & Education Specialists. All rights reserved.
Reproduction or republication strictly prohibited without prior written permission.

ADCES Association of Diabetes Care & Education Specialists



MANEJAR LA HIPERGLUCEMIA

Usando los agonistas del receptor GLP-1

CÓMO TOMAR ESTE MEDICAMENTO:

Al igual que la insulina, los medicamentos GLP-1 deben ser inyectados dentro de la capa de grasa justo debajo de la piel. Los lugares que puede usar son el abdomen (colocándolo a dos dedos o a pocas pulgadas de distancia del ombligo), en la parte exterior de los muslos, en las caderas, área superior de los glúteos, zona lumbar y la parte posterior de los brazos.

Mejores sitios para inyectar



FRENTE DORSO

 Copyright © 2020 Association of Diabetes Care & Education Specialists. All rights reserved.
Reproduction or republication strictly prohibited without prior written permission.

ADCES Association of Diabetes Care & Education Specialists



MANEJAR LA HIPERGLUCEMIA

Usando los agonistas del receptor GLP-1

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1

Lavarse las manos antes y después del uso.

2



Siga las instrucciones del paquete de GLP-1 para preparar el medicamento. Para obtener más información, revise los Consejos profesionales para inyectar de una mejor manera.

3



Coloque la inyección dentro de una parte adiposa de la piel como en la parte de arriba del muslo, en el área abdominal o en la parte superior del brazo. Apriete el área e inserte directamente dentro de la piel.

4



Coloque este medicamento en un lugar diferente de donde coloca la insulina si también utiliza insulina.

5

Deseche las agujas en una caja para agujas/objetos cortantes. No reutilice las agujas.

 Copyright © 2020 Association of Diabetes Care & Education Specialists. All rights reserved.
Reproduction or republication strictly prohibited without prior written permission.

ADCES Association of Diabetes Care & Education Specialists



MANEJAR LA HIPERGLUCEMIA

Usando los agonistas del receptor GLP-1

CÓMO ALMACENAR ESTE MEDICAMENTO:

Proteger de la luz.

No lo congele, y nunca lo utilice si se congela.

Almacenar en un refrigerador o a temperatura ambiente.

Deseche el lápiz 30 días después del primer uso.

 Copyright © 2020 Association of Diabetes Care & Education Specialists. All rights reserved.
Reproduction or republication strictly prohibited without prior written permission.